

精巣腫瘍に対する BEP療法

(ブレオ+エトポシド+シスプラチン)

DRPHW_DRPHW_1

2021年11月01日 改訂(第10版)


Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(2日目~5日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
				【調製指示(9日目、16日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/) ~ Day5(/)



Day 1(/)

《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル 125mg 1カプセル

Day 2(/) Day3(/)


《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

Day 9(/)

Day16(/)

本管



← 1コース →

	1週目					2週目			3週目		
day	1	2	3	4	5	8	9	...	15	16	...
CDDP	○	○	○	○	○						
VP-16	○	○	○	○	○						
BLM							○			○	

BEP療法

標準投与量:

CDDP	20 mg/m ²	day1-5
VP-16	100 mg/m ²	day1-5
BLM	30 mg/body	day2,9,16
4週毎(3-4コース)		