

尿路上皮癌・膀胱癌に対する 動注化学療法(TAI)

DRPHW_DRPHW_1

2021年11月01日 改訂(第7版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	動注化学療法		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

Day 1 (/)

《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル 125mg 1カプセル

9:00 ルート確保、バルン留置

本管

ソルデム3A 500mL

① (167mL/h)

パロノセトロン 0.75mg/50mL (30min)

ラクテック 500mL

デキサート注6.6mg 1A

② (167mL/h)

13:00 【アンギオ室へ持参】

(i.m.) 硫酸アトロピン 1A

(ルート) アタラックスP 1A

5%ブドウ糖 1,000mL

生理食塩水 1,000mL

マンニトール 300mL

アスパラK 40mL

(167mL/h)

翌日まで持続点滴

《動注》

シスプラチン mg

テラルビシン mg

蒸留水 20mL

Day 2 (/)

《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

本管

ソルデム3A 500mL

① (100mL/h)

ラクテック 500mL

② (100mL/h)

ソルデム3A 500mL

③ (100mL/h)

終了抜去

Day 3 (/)

《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

動注化学療法(TAI)

標準投与量:

CDDP 70 mg/m² day1(動注)

THP 30 mg/m² day1(動注)

3週毎