

精巣腫瘍に対する TIP療法 (PTX+IFO+CDDP)

(パクリタキセル+イホマイド+シスプラチン) RPHW_DRPHW_

2011年03月08日 承認
2021年11月01日 改訂(第12版)


Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製			
アルコール過敏症	備考[標準投与量逸脱など]	放射線併用	【調製指示(2日目以降)】			
<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり(慎重投与)		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製			

Day 1 (/)



Day2 (/) ~ Day6 (/)



Day 2 (/)

《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル 125mg 1カプセル

Day 3 (/) ~ Day6 (/)

《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

TIP療法

標準投与量:

CDDP	20 mg/m ²	day2-6
IFO	1,200 mg/m ²	day2-6
PTX	175 mg/m ²	day1

4週毎