

胚細胞腫瘍に対する BEP療法

(シスプラチン+エトポシド+ブレオ)

RPHW_DRPHW_1

2021年11月01日 改訂(第8版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 【調製指示(2日目~5日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 【調製指示(9日目、16日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]						


★投与スケジュール★

	1コース														
	1週目		2週目			3週目		4週目							
day	1	2	3	4	5	...	8	9	...	15	16	...	22
CDDP	○	○	○	○	○										
VP-16	○	○	○	○	○										
BLM		○						○			○				

Day1 (/) ~ Day5 (/)



Day 9 (/) Day16 (/)



Day1~Day5で尿量が少ないときは、マンニトール、もしくは輸液の増量を検討すること。

PEB療法

標準投与量:

CDDP	20 mg/m ²	day1-5
VP-16	100 mg/m ²	day1-5
BLM	20 mg/m ²	day2,9,16

4週毎(3-4コース)