

乳癌に対する CPT-11療法

(イリノテカン)

DRPHW_DRPHW_1

2011年06月14日 承認
2021年11月01日 改訂(第5版)

Dr.sign


/

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(Day8,Day15)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/) ・ Day8(/) ・ Day15(/) ・ Day21(/)



Day2(/) ~ Day3(/)

Day9(/) ~ Day10(/)

Day16(/) ~ Day17(/)

Day22(/) ~ Day23(/)

《治療翌日朝より服用開始》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 - (1) ナウゼリン坐薬 60mg
 - (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

- ◇吃逆著明時
 - (1) プリンペラン1A iv
 - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

CPT-11療法

標準投与量:

CPT-11 100 mg/m² day1,8,15,22
6週毎(4投2休)