

卵巣腫瘍に対する Doxil+CBDCA療法

(ドキシル+カルボプラチン)

DRPHW_DRPHW_1

2021年11月01日 改訂(第7版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ () コース目		実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
大豆アレルギー <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり(慎重投与)	備考[標準投与量逸脱など]					

Day1 (/)


《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

5%ブドウ糖 500mL

側管



終了抜去

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	<input type="checkbox"/> Cockcroft-Gault
<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> Jelliffe
<input type="checkbox"/> 補正なし	<input type="checkbox"/> 24hrCcr
	<input type="checkbox"/>

Day2 (/) ~ Day3 (/)

《治療翌日より服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

Doxil+CBDCA療法

標準投与量:

Doxil	30 mg/m ²	day1
CBDCA	AUC = 5	day1
4週毎		