

# 卵巣癌に対する Bev + TJ 療法 (Bev + PTX + CBDCA)

(アバスチン+パクリタキセル+カルボプラチン) RPHW\_D RPHW\_L

2015年05月19日 承認  
2021年11月01日 改訂(第7版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
アルコール過敏症 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり(慎重投与)	備考[標準投与量逸脱など]					

Day1 ( / )

### 《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用

本管

ソルアセトD 500mL

側管

(側管終了まで維持)

全開で 生理食塩水 50mL

生理食塩水 100mL  
アバスチン mg

(10min) 生理食塩水 50mL  
ガスター20mg 1A  
ポラミン5mg 1A  
デキサート6.6mg 2V  
デキサート3.3mg 1A  
(リン酸エステル換算 20mg)

(30min) パロノセトロン 0.75mg/50mL

専用ルート (3hr) 5%ブドウ糖 500mL  
パクリタキセル mg

※3時間以上かけて

(1.5hr) 生理食塩水 250mL  
カルボプラチン mg

※1時間以上かけて

全開で 生理食塩水 50mL

終了抜去

Day2 ( / ) ~ Day3 ( / )

### 《治療翌日より服用》

デカドロン錠 1回 4錠を  
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用

初回 : 90分かけてdiv  
↓ (忍耐力良好)  
2回目 : 60分で投与可  
↓ (忍耐力良好)  
以降 : 30分で投与可

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	<input type="checkbox"/> Cockcroft-Gault
<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> Jelliffe
<input type="checkbox"/> 補正なし	<input type="checkbox"/> 24hrCcr
	<input type="checkbox"/>

Bev + TJ療法

### 標準投与量:

Bev 15 mg/kg day1  
PTX 175 mg/m<sup>2</sup> day1  
CBDCA AUC=5 day1

3-4週毎