

多発性骨髄腫に対する DMPB療法(2-9サイクル目)

(ダラザレックス+アルケラン+プレドニン+ベルケイド)

DRPHW_DRPHW_1

2021年10月18日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(4日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/) Day22 (/)

Day1 (/) Day8 (/)

Day22 (/) Day29 (/)

《ダラザレックス投与1時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T
モンテルカスト錠(10) 1T
過敏反応防止のため

皮下注

ベルケイド mg

※ 注射部位反応に注意

本管

側管

(30min)

生理食塩水 100mL
ポラミン注5mg 1A
デキサート6.6mg 2V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 20mg)

専用ルート

生理食塩水 500mL
ダラザレックス mg

全開で

生理食塩水 50mL

Day1 (/) ~ Day4 (/)

アルケラン

★1日 mg

服用

Day2 (/) ~ Day4 (/)

プレドニン

★1日 mg

服用

※ダラザレックスの投与速度

0~1時間

↓ () mL/hr

1~2時間

↓ () mL/hr

2~3時間

↓ () mL/hr

3時間以降

↓ () mL/hr

DMPB療法(2-9サイクル目)

標準投与量:

Daratumumab	16 mg/kg	day 1,2,2,2
Melphalan	9 mg/m ²	day 1-4
Predonison	60 mg/m ²	day 2-4
Bortezomib	1.3 mg/m ²	day 1,8,22,28

6週毎