

多発性骨髄腫に対する DMPB(s.c)療法(2-9サイクル目)

(ダラキューロ+アルケラン+プレドニン+ベルケイド)

DRPHW_DRPHW_1

2021年10月18日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長	体重	体表面積
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	実施サイクル	コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]					【調製指示(4日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	

Day1 (/) Day22 (/)

Day1 (/) Day8 (/)
Day22 (/) Day29 (/)

《ダラキューロ投与1~3時間前に服用》

皮下注


カロナール錠(500) 2T
モンテルカスト錠(10) 1T 過敏反応防止のため
ポララミン錠(2) 2T

ベルケイド mg

※ 注射部位反応に注意

点滴治療の場合(ダラキューロ投与前に施行)

本管



内服治療の場合

レナデックス

★1日 mg

ダラキューロ投与1~3時間前(朝食後でも可)に服用

Day1 (/) ~ Day4 (/)

アルケラン

★1日 mg

服用

Day2 (/) ~ Day4 (/)

プレドニン

★1日 mg

服用

皮下注(約3~5分かけて)

ダラキューロ配合皮下注 1800 mg (15mL)

※ デキサート投与終了後に皮下注

DMPB(s.c)療法(2-9サイクル目)

標準投与量:

Daratumumab	1800 mg/body day	1,2,2
Melphalan	9 mg/m ²	day 1-4
Predonison	60 mg/m ²	day 2-4
Bortezomib	1.3 mg/m ²	day 1,8,22,29
6週毎		