

急性リンパ性白血病に対する hyper-CVAD療法

(エンドキサン+オンコビン+ドキシソルビシン+デカドロン) RPHW_DRPHW

2015年04月06日 承認


Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示(初日~Day4)】	
	月	日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]					【調製指示(Day11~Day14)】	
					<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	


Day1(/) ~ Day3(/)




Day11(/)



Day12(/) ~ Day14(/)



Day4(/)



hyper-CVAD療法

標準投与量:

CPA	300 mg/m ² × 2	day1-3
VCR	2 mg/body	day4,11
ADM	50 mg/m ²	day4
Dexa	40 mg/body	day1-4,11-14
Mesna	120 mg/m ² × 6	day1-3

3-4週毎