

胃に対する XELOX療法

(オキサリプラチン+カペシタビン)

DRPHW_DRPHW_1

2015年01月13日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1(/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

5%ブドウ糖 250mL

側管

開始時 (15min)
グラニセトン1mg/生食50mL
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)

(2hr)
5%ブドウ糖 500mL
オキサリプラチン mg

全開で
5%ブドウ糖 50mL
ルートフラッシュ後 破棄可

Day1(/)夕 ~ Day15(/)朝

内服薬

カペシタビン錠

★1日量 mg

※1回 錠 (mg / 回)
を1日2回、14日間服用

Day2(/) ~ Day3(/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

XELOX療法

標準投与量:

L-OHP 130 mg/m² day1

Capecitabine 2,000 mg/m² day1-14

3週毎