

悪性リンパ腫(ホジキン)に対する ABVd療法

(アドリアシン+ブレオ+エクザール+ダカルバジン)_{RPHW_D RPHW_L}

2008年10月21日 承認
2022年02月14日 改訂(第7版)

Dr.sign


Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》 様	年齢 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2回目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/ /) ・ Day15(/ /)

本管



血管痛防止のため、アルミホイルや遮光袋を利用して、点滴経路全般を遮光すること。

ABVd療法

標準投与量:

ADM	25 mg/m ²	day1,15
BLM	9 mg/m ²	day1,15 (max:15mg/body)
VBL	6 mg/m ²	day1,15 (max:10mg/body)
DTIC	250 mg/m ²	day1,15

4週毎