

非小細胞肺癌に対する CPT-11+GEM療法

(イリノテカン+ゲムシタビン)

DRPHW_DRPHW_1

2022年02月14日 改訂(第9版)


Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(Day8)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/ /) ・ Day8(/ /)



Day2(/ /) ~ Day3(/ /)

Day9(/ /) ~ Day10(/ /)

**デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用**

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 - (1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
 - (2) (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
 - (1) プリンペラン1A iv
 - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

CPT-11+GEM療法

標準投与量:

CPT-11 100 mg/m² day1,8
 GEM 1,000 mg/m² day1,8

4週毎