

小細胞肺癌に対する CDDP+AMR療法

(シスプラチン+カルセド)

DRPHW_DRPHW_1

2011年09月15日 承認
2022年02月04日 改訂(第7版)


Dr.sign /

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		


Day1(/ /)



調製後3時間
以内に使用

全量
mL

Day2(/ /) ~ Day3(/ /)



【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 - (1) ナウゼリン坐薬 60mg
 - (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv
- ◇吃逆著明時
 - (1) プリンペラン1A iv
 - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始
- ◇蓄尿 Day1(/ /)~Day3(/ /)
16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

CDDP+AMR療法

標準投与量:

CDDP	60 mg/m ²	day1
AMR	40 mg/m ²	day1-3
3-4週毎		