

胸腺腫瘍に対する CDDP+PTX療法

(シスプラチン+パクリタキセル)

DRPHW_DRPHW_1

2012年02月14日 承認
2022年02月09日 改訂(第8版)

Dr.sign /

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
アルコール過敏症 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1(/)


※初回のみモニタを装着すること!!

本管



Day2(/) ~ Day3(/)

本管



【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 - (1) ナウゼリン坐薬 60mg
 - (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv
- ◇吃逆著明時
 - (1) プリンペラン1A iv
 - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3× 開始
- ◇蓄尿 Day1(/)~Day3(/)
 - 16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

CDDP+PTX療法

標準投与量:

CDDP	80 mg/m ²	day1
PTX	180 mg/m ²	day1
3週毎		