

# 膵癌に対する FOLFIRINOX療法

(レボホリナート+オキサリプラチン+イリノテカン+5-FU)

RPHW\_DRPHW\_1

2022年02月14日 改訂(第5版)

Dr.sign

/

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》 様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1 ( / )

Day2 ( / ) ~ Day3 ( / )

**本管**

ソルデム3A 500ml

側管

ルート確保

生理食塩水 50mL

全開で

開始時

(30min)

パロノセトロン 0.75mg/50mL

アロカリス 1V

デキサート6.6mg 1V

(リン酸エステル換算 8mg)

(2hr)

5%ブドウ糖 250mL

オキサリプラチン mg

(2hr)

5%ブドウ糖 250mL

レボホリナート mg

(2hr)

5%ブドウ糖 250mL

イリノテカン mg

(全開でdiv)

(2分程度で)

生理食塩水 20mL

フルオロウラシル mg

←50mLの容器から  
30mLを破棄

(全開でdiv)

生理食塩水 50mL

ソルデム3A

※5-FU持続点滴開始より主管接続

(24hr)

生理食塩水 460 mL

フルオロウラシル mg

(46hr)

★全量460mLに調製

《治療翌日より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を  
1日2回(朝昼食後) 服用

↓

ソルデム3A

※昨日主管のつなぎ替え

(24hr)

(全開で)

生理食塩水 50mL

5-FU持続点滴終了後

終了抜去

FOLFIRINOX療法

標準投与量:

L-OHP	85 mg/m <sup>2</sup>	day1
I-LV	200 mg/m <sup>2</sup>	day1
CPT-11	180 mg/m <sup>2</sup>	day1
5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	(bolus)
5-FU	2,400 mg/m <sup>2</sup>	(46hr持続)

2週毎