

# 多発性骨髄腫に対する IsaKd療法(1サイクル目)

(サークリサ+カiproロリス+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW

2022年1月17日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)2日目は調整可 □調製可 □TEL連絡後調製 【調製指示(8日目)9日目は調整可 □調製可 □TEL連絡後調製 【調製指示(15日目)16日目は調整可 □調製可 □TEL連絡後調製 【調製指示(22日目) □調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]	月 日 ~ ( )	コース目	コース予定			

Day1( / ) Day8( / )  
Day15( / ) Day22( / )


## 《サークリサ投与30分前に服用》

カロナール錠 1000mg (過敏反応防止の為)

Day1( / ) Day8( / )  
Day15( / )



Day2( / ) Day9( / ) Day16( / )



- 【Dr必須項目】
- サークリサ初回(Day1)投与前に不規則抗体測定
  - 輸血検査室へ投与開始日の連絡

day1  
※サークリサ投与速度  
0-1時間 ↓ ( ) mL/hr  
1時間-1時間30分 ↓ ( ) mL/hr  
以後30分毎2時間で速度調整 ↓ ( ) mL/hr

day8.15.22  
※サークリサ投与速度  
0-1時間 ↓ ( ) mL/hr  
1時間-1時間30分 ↓ ( ) mL/hr  
以後30分毎2時間で速度調整 ↓ ( ) mL/hr

IsaKd療法(1サイクル目)

標準投与量:

Isatukisimab	10 mg/kg	day1,8,15,22
Dexa	40 mg/body/week	day1,2,8,9,15,16,22
Carfiluzomib	20 mg/m <sup>2</sup>	day1,2
	56 mg/m <sup>2</sup>	day8,9,15,16

4週毎