

# 多発性骨髄腫に対する Isad療法【74歳以下】(1コース目)

(サークリサ+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW\_V

2022年1月17日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目 ( )	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		


**【Dr必須項目】**

- サークリサ初回(Day1)投与前に不規則抗体測定
- 輸血検査室へ投与開始日の連絡

Day1 ( / ) Day8 ( / ) Day15 ( / ) Day22 ( / )

**《サークリサ投与30分前に服用》**

カロナール錠 1000mg (過敏反応防止の為)



day1

※サークリサ投与速度

0 - 1時間 ↓ ( ) mL/hr  
 1時間-1時間30分 ↓ ( ) mL/hr  
 以後30分毎2時間で速度調整 ↓ ( ) mL/hr

day8.15.22

※サークリサ投与速度

0 - 1時間 ↓ ( ) mL/hr  
 1時間-1時間30分 ↓ ( ) mL/hr  
 以後30分毎2時間で速度調整 ↓ ( ) mL/hr

Isad療法(1コース目)

標準投与量:

Isatuximab 20 mg/kg day 1.8.15.22  
 Dexamethasone 40 mg/body day 1.8.15.22  
 4週毎