

多発性骨髄腫に対する Isad療法【75歳以上】(2コース目以降)

(サークリサ+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHV

2022年1月17日 承認

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 様 《SYAGE》	身長	体重	体表面積
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	0.00 r
備考[標準投与量逸脱など]					【調製指示(15日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	

Day1 (/) Day15 (/)

《サークリサ投与30分前に服用》

カロナール錠 1000mg 過敏反応
防止の為



Day8 (/) Day22 (/)

デカドロン錠 mg

レナデックス錠 mg

day1.15

※サークリサ投与速度

0 - 1時間	↓ () mL/hr
1時間-1時間30分	↓ () mL/hr
以後30分毎2時間で速度調整	↓ () mL/hr

Isad療法(2コース目以降)

標準投与量:		
Isatuximab	20 mg/kg	day 1.15
Dexa	20 mg/body	day 1.8.15.
		4週

用



N_V

n²

製

製

5

.22

每