

# 膵癌に対する Onivyde+5FU+I-LV療法【外来】

(リポソームイリノテカン+レボホリナート+5-FU)

DRPHW\_DRPHW\_1

2020年07月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1 ( / )

Day2 ( / ) ~ Day3 ( / )

**アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用**

《治療翌日より2日間服用》


**アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用**

本管(中心静脈ポート)

ルート確保後、主管は止めること

生理食塩水 100mL

側管



液量が異なるため  
流速に注意！！

終了後に自己抜針

(初回は本人及び家族に指導し、  
自己抜針してもらう)

Onivyde+5FU+I-LV療法

標準投与量:

Onivyde	70 mg/m <sup>2</sup>	day1
I-LV	200 mg/m <sup>2</sup>	day1
5-FU	2,400 mg/m <sup>2</sup>	(46hr持続) 2週毎