

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する Pola-BR(BW:40kg以上)療法

ポライビー+ベンダムスチン+リツキシマブ)RPHW_D)RPHW_)

2021年05月27日
2023年10月12日 改訂(第3版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

※体重40kg以上

Day1(/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)



※リツキシマブ投与速度

最初の1時間
↓ () mg/hr
次の1時間
↓ () mg/hr
以後
↓ () mg/hr


★10倍希釈の場合はmg = mL

初回 : 90分で投与可
↓ (忍耐力良好)
以降 : 30分で投与可

Day2(/) Day3(/)

《ポライビー投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)



Pola-BR(BW:40kg以上)療法

標準投与量:

Polatuzumab	1.8 mg/kg	day2
R	375 mg/m ²	day1
Bendamustine	90 mg/m ²	day2,3
3週毎		

※ベンダムスチンは調製後6時間以内に必ず使用する