

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する Pola-BR(BW:40kg未満)療法

ポライビー+ベンダムスチン+リツキシマブ)RPHW_D)RPHW_)

2021年05月27日

2023年10月12日 改訂(第3版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

※体重40kg未満

Day1(/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》


ポララミン錠	1錠	(過敏反応)
カロナール錠	500mg	(防止の為)



Day2(/) Day3(/)

《ポライビー投与30分前に服用》

ポララミン錠	1錠	(過敏反応)
カロナール錠	500mg	(防止の為)



Pola-BR(BW:40kg未満)療法

標準投与量:

Polatuzumab	1.8 mg/kg	day2
R	375 mg/m ²	day1
Bendamustine	90 mg/m ²	day2,3
3週毎		

※ベンダムスチンは調製後6時間以内に必ず使用する