

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する エプキンリ療法(2-3サイクル目)

(Epcoritamab)

)RPHW_D)RPHW_)

2023年11月27日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]		コース予定	【調製指示(8日目)】			
			□調製可 □TEL連絡後調製			
			【調製指示(15日目)】			
			□調製可 □TEL連絡後調製			
			【調製指示(22日目)】			
			□調製可 □TEL連絡後調製			

Day1(/) Day8(/) Day15(/) Day22(/)

皮下注

エプキンリ皮下注 48 mg

液量 0.8mL

【Dr必須項目】

前回投与時のサイトカインストーム

- グレード1:ステロイド不要(レジメンセットから削除)
 グレード2-3: day1-4にステロイドを投与

Day1(/) ~ Day4(/)

Day8(/) ~ Day11(/)

Day15(/) ~ Day18(/)

Day22(/) ~ Day25(/)

内服薬(サイトカインストーム予防として)
プレドニン錠

★1日 100 mg

皮下注当日から 4日間 服用

※ 皮下注当日は
エプキンリ投与60分前に服用

Epcoritamab療法(2-3サイクル目)

標準投与量:

Epcoritamab 48 mg/body day 1.8.15.22

4週毎