

## 悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する エプキンリ療法(4-9サイクル目)

(Epcoritamab)

)RPHW\_D)RPHW\_

2023年11月27日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ( )コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(15日目)】			
			<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製			

Day1( / ) Day15( / )

## 皮下注

エプキンリ皮下注 48 mg

液量 0.8mL

## 【Dr必須項目】

前回投与時のサイトカインストーム

- グレード1:ステロイド不要(レジメンセットから削除)  
 グレード2-3: day1-4にステロイドを投与

Day1( / ) ~ Day4( / )

Day15( / ) ~ Day18( / )

## 内服薬(サイトカインストーム予防として)

## プレドニン錠

★1日 100 mg

皮下注当日から 4日間 服用

※ 皮下注当日は  
エプキンリ投与60分前に服用

Epcoritamab療法(4-9サイクル目)

## 標準投与量:

Epcoritamab 48 mg/body day 1.15

4週毎