

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する エプキンリ療法(10サイクル目以降)

(Epcoritamab)

)RPHW_D)RPHW_)

2023年11月27日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	□ 調製可 □ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]						

Day1(/)

皮下注

エプキンリ皮下注 48 mg

液量 0.8mL

【Dr必須項目】

前回投与時のサイトカインストーム

- グレード1:ステロイド不要(レジメンセットから削除)
- グレード2-3: day1-4にステロイドを投与

Day1(/) ~ Day4(/)

内服薬(サイトカインストーム予防として)

プレドニン錠

★1日 100 mg

皮下注当日から 4日間 服用

※ 皮下注当日は
エプキンリ投与60分前に服用

Epcoritamab療法(10サイクル目以降)

標準投与量:

Epcoritamab 48 mg/body day 1

4週毎