

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する R-Bendamustine療法

(リツキシマブ+ベンダムスチン)

RPHW_DRPHW_1

2011年01月11日 承認
2023年10月12日 改訂(第7版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2回目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポララミン錠	1錠	過敏反応
カロナール錠	500mg	防止の為




※リツキシマブ投与速度

最初の1時間	↓ () mg/hr
次の1時間	↓ () mg/hr
以後	↓ () mg/hr

★10倍希釈の場合はmg = mL

Day2 (/) Day3 (/)



※ベンダムスチンは調製後6時間以内に必ず使用する

R-Bendamustine療法

標準投与量:

R	375 mg/m ²	day1
Bendamustin	90 mg/m ²	day2.3
3週毎		