

膀胱癌(尿路上皮癌)に対する GC療法(GEM+CDDP)

(ゲムシタビン+シスプラチン) RPHW DRPHW

2009年12月08日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日、2日目)】			
	月 日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]	放射線併用	【調製指示(8日目、15日目)】				
	□有 □無	□調製可 □TEL連絡後調製				

Day 1 (/)

Day 8 (/)

Day 15 (/)

本管

ソルデム3A 1000mL

(6hr)

側管

開始時
(30min)生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

(30min)

生理食塩水 100mL
ゲムシタビン mg

全開で

生理食塩水 50mL

Day 2 (/)

ソルデム3A 1000mL 本管

① (4hr=2hr×2)

開始時
(30min)パロノセトロン 0.75mg/50mL
アロカリス 1V
デキサート6.6mg 1A
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

側管

全開で

生理食塩水 50mL

(1hr)

生理食塩水 100mL
硫酸Mg 10mL

ソルデム3A 1500mL

② (9hr)

(30min)

マンニトール 300mL

遮光

(2hr)

生理食塩水 300 mL★
シスプラチン mg

全量

mL

全開で

生理食塩水 50mL

Day 3 (/)

ソルデム3A 1000mL 本管

(8-9hr)

(1hr)

生理食塩水 100mL
硫酸Mg 10mL

側管

(30min)

マンニトール 300mL

終了後抜針

★投与スケジュール★

	1コース									
	1週目			2週目			3週目			4週目 ...
day	1	2	...	8	...	15	...	22	...	...
CDDP		○								
GEM	○			○		○		×		

GC療法

標準投与量:

GEM 1,000 mg/m² day1,8,15CDDP 70 mg/m² day2

4週毎