

膀胱癌(尿路上皮癌)に対する GEM＋CBDCA 療法

(ゲムシタビン＋カルボプラチン) RPHW DRPHW

2022年05月20日 改訂(第7版)

Dr.sign


Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	コース予定	【調製指示(初日)】		
	月 日 ~ ()コース目			☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(Day8)】		
			☐ 有 ☐ 無	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		

Day1 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用




Day2 (/) ~ Day3 (/)

《治療翌日朝より服用開始》

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

Day8 (/)



使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	☐ Cockcroft-Gault
☐ 補正あり	☐ Jelliffe
☐ 補正なし	☐ 24hrCcr
	☐

CBDCA＋GEM療法

標準投与量:

CBDCA AUC=5 day1
GEM 1,000 mg/m² day1,8
3週毎