

B細胞性リンパ腫に対する R-FCM療法

(リツキシマブ+フルダラ+エンドキサン+ノバントロン) (RPHW_DRPHW)

2012年02月14日 承認

2015年09月15日 改訂(第4版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠	過敏反応
カロナール錠 500mg	防止の為




※リツキシマブ投与速度


最初の1時間	↓ () mg/hr
次の1時間	↓ () mg/hr
以後	↓ () mg/hr

★10倍希釈の場合はmg = mL

Day2 (/)



Day3 (/) ~ Day4 (/)



R-FM療法

標準投与量:

Rituximab	375 mg/m ²	day1
MIT	8 mg/m ²	day2
F-ara-A	25 mg/m ²	day2-4
CPA	200 mg/m ²	day2-4