

# B細胞性リンパ腫に対する R-FM療法

(リツキシマブ+フルダラ+ノバントロン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2012年02月14日 承認  
2015年09月15日 改訂(第4版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 ( / )

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠 (過敏反応)  
カロナール錠 500mg (防止の為)




※リツキシマブ投与速度


最初の1時間  
↓ ( ) mg/hr  
次の1時間  
↓ ( ) mg/hr  
以後  
↓ ( ) mg/hr

★10倍希釈の場合はmg = mL

Day2 ( / )



Day3 ( / ) ~ Day4 ( / )



R-FM療法

標準投与量:

Rituximab 375 mg/m<sup>2</sup> day1  
MIT 10 mg/m<sup>2</sup> day2  
F-ara-A 25 mg/m<sup>2</sup> day2-4