

食道癌に対する Weekly Paclitaxel療法

(パクリタキセル)

DRPHW_DRPHW_1

2012年05月08日 承認
2019年09月25日 改訂(第5版)


Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 <<SYPID>>	氏名 <<ORIBP_KANJI>>	年齢 様 <<SYAGE>>	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()コース目		実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
アルコール過敏症 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり(慎重投与)	備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無						

Day1(/) ・ Day8(/) ・ Day15(/)
Day22(/) ・ Day29(/) ・ Day36(/)



【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 - (1) ナウゼリン坐薬 60mg
 - (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

- ◇吃逆著明時
 - (1) プリンペラン1A iv
 - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

weekly Paclitaxel療法

標準投与量:

PTX 100 mg/m² day1,8,15,22,29,36
7週毎(6投1休)