

慢性リンパ性白血病に対する Ofatumumab療法(維持)

(アーゼラ)

DRPHW_DRPHW_1

2014年04月01日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(2回目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/)

以後4週間おきに投与

《点滴開始時に服用》(過敏症予防)

ザイザル5mg錠 1錠
カロナール錠 500mg 1錠



※1 Ofatumumab投与速度について

投与経過時間	投与速度
0~30分	25mL/hr
31~60分	50mL/hr
61~90分	100mL/hr
91~120分	200mL/hr
121分~	400mL/hr

上記表までを上限として投与速度設定可能

※2 プレドニン注は3回目以降の投与は任意

Ofatumumab療法

標準投与量:

Ofatumum:	300 mg/body day1
	2000 mg/body day8,15,22
	day29,36,43
	day50,78
	day106,134
	day162
	1週,4週毎