

慢性リンパ性白血病に対する Ofatumumab療法(導入)

(アーゼラ)

DRPHW_DRPHW_1

2014年04月01日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(2回目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/)

《点滴開始時に服用》(過敏症予防)

ザイザル5mg錠 1錠
カロナール錠500mg 1錠



※1 初回Ofatumumab投与速度について

投与経過時間	投与速度
0~30分	12mL/hr
31~60分	25mL/hr
61~90分	50mL/hr
91~120分	100mL/hr
121~150分	200mL/hr
151~180分	300mL/hr
181分~	400mL/hr


上記表までを上限として投与速度設定可能

Day8(/)・Day15(/)

以後Day50まで週1回投与

《点滴開始時に服用》(過敏症予防)

ザイザル5mg錠 1錠
カロナール錠500mg 1錠



※2 2回目以降Ofatumumab投与速度について

投与経過時間	投与速度
0~30分	25mL/hr
31~60分	50mL/hr
61~90分	100mL/hr
91~120分	200mL/hr
121分~	400mL/hr

上記表までを上限として投与速度設定可能

※3 プレドニン注は3コース目以降の投与は任意

Ofatumumab療法

標準投与量:

Ofatumumab: 300 mg/body day1

2000 mg/body day8,15,22,29,36,43,50,78,106,134,