

大腸癌に対する mFOLFOX6 + Cetuximab療法

(レボホリナート+オキサリプラチン+フルオロウラシル+アービタックス) RPHW_DRPHW_1

2015年09月15日 承認

2020年04月16日 改訂(第版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示】		
	月	日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用		
				<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1 (/ /)

Day2 (/ /) ~ Day3 (/ /)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

《治療翌日朝より2日間服用》


デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

本管(中心静脈ポート)


ポートフラッシュ

側管



全量 mL
初回以後

Day8 (/ /)



全量 mL

※50mLの容器から
30mLを破棄

終了後に自己抜針

mFOLFOX6 + Cetuximab療法

標準投与量:

Cetuximab	250 mg/m ²	day1,8
(初回のみ400mg/m ²)		
I-LV	200 mg/m ²	day1
I-OHP	85 mg/m ²	day1
5-FU	400 mg/m ²	(bolus)
5-FU	2,400 mg/m ²	(46hr持続)

2週毎