

神経内分泌腫瘍に対する CDDP+VP-16療法

(シスプラチン+エトポシド)

DRPHW_DRPHW_1

2016年01月26日 承認


Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示(初日)】		
	月 日 ~ ()コース目		コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(2日目以降)】		
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/)



Day2 (/) ~ Day3 (/)



【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 - (1) ナウゼリン坐薬 60mg
 - (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv
- ◇吃逆著明時
 - (1) プリンペラン1A iv
 - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3× 開始
- ◇蓄尿 Day1 (/) ~ Day3 (/)
16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

CDDP+VP-16療法

標準投与量:

CDDP	80 mg/m ²	day1
VP-16	100 mg/m ²	day1-3
		3-4週毎