

# 多発性骨髄腫に対する ELD療法(1-2コース目)

(エムプリシティ+レブラミド+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW\_V

2020年1月14日 改訂  
2017年01月20日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 様《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		


## 内服薬

レブラミドカプセル
★1日 ( ) mg
21日間 服用

Day1( / ) Day8( / ) Day15( / ) Day22( / )

### 《エムプリシティ投与30分前に服用》

ポララミン錠	1錠	(過敏反応)
カロナール錠	500mg	(防止の為)



### ELD療法(1-2コース目)

標準投与量:		
Elotuzumab	10 mg/kg	day 1.8.15.22
Dexa	20 mg/body	day 1.8.15.22
Lenalido	25 mg/body	day1-21
4週毎		