

多発性骨髄腫に対する ELD療法(3コース目以降)

(エムプリシティ+レブラミド+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW_V

2020年1月14日 改訂
2017年01月20日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 様《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(15日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

内服薬

レブラミドカプセル

★1日 mg

21日間 服用


Day1(/) Day15(/)

《エムプリシティ投与30分前に服用》

ポララミン錠	1錠	過敏反応
カロナール錠	500mg	防止の為

本管

側管



Day8(/) Day22(/)

デカドロン錠 mg

レナデックス錠 mg

ELD療法(1-2コース目)

標準投与量:

Elotuzumab	10 mg/kg	day 1.8.15.22
Dexa	20 mg/body	day 1.8.15.22
Lenalido	25 mg/body	day1-21
4週毎		