

急性リンパ性白血病に対するJALSG ALL202 寛解導入療法

(エンドキサン+ダウノルビシン+オンコビン+プレドニン+ロイナーゼ) DRPHW_DRPHW

2017年4月13日 作成

Dr.sign


Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(初日以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/ /)


本管



Day8 (/ /) Day15 (/ /)

Day22 (/ /)

本管




Day9 (/ /) Day11 (/ /)

Day13 (/ /) Day16 (/ /)


Day18 (/ /) Day20 (/ /)

Day2 (/ /) Day3 (/ /)

本管



本管



内服薬

プレドニン錠

★1日 mg

21日間 服用

※Day9のロイナーゼは一部ブリックテストに使用。医師指示あるまで接続しない!!

JALSG ALL 202 Induction

標準投与量:

CPA	1200 mg/m ²	day1
DNR	60 mg/m ²	day1-3
VCR	1.3 mg/m ²	day1,8,15,22
	(max:2mg/body)	
PSL	60 mg/m ²	day1-21
L-ASP	3000 IU/m ²	day9,11,13,16,18,20