

急性リンパ性白血病に対するJALSG ALL202 地固め療法(C2)

JRPHW_DRPHW_V

2017年07月06日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(翌日以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/ /) ・ Day15 (/ /)

(随注)

注射用水	4mL
メソトレキセート	15mg
デキサート3.3mg	1A
(リン酸エステル換算 4mg)	

Day1 (/ /) ・ Day15 (/ /)

本管

ビカネイト 1L	} × (2)
7% メイロン 20mL	

Day2 (/ /) ~ Day22 (/ /)

内服薬

ロイケリン散
★1日 mg
21日間 服用

Day3 (/ /) ・ Day4 (/ /)

Day17 (/ /) ・ Day18 (/ /)

本管

ビカネイト 1L	} × (3)
7% メイロン 20mL	

/ / からフロセミド、NSAIDs,PPI服用時は中。
/ / からダイフェン服用時は中止。
(ロイコボリン投与終了後より再開可能)
・尿量3L,尿pH7.0以上に保つ。


疼痛・発熱時は塩基性NSAIDs(ソランタール)
もしくはカロナールで対応を!!

Day2 (/ /) ・ Day16 (/ /)

本管

ビカネイト 1L	} × (3)
7% メイロン 20mL	

側管



JALSG202 consolidation(C2)

標準投与量:

MTX 3000 mg/m² day2.16

※60歳以上は 1500mg/m²

VCR 1.3 mg/m² day2.16

(max:2mg/body)

6-MP 25 mg/m² day2-22