

多発性骨髄腫に対する DLd療法(2サイクル目)

(ダラザレックス+レブラミド+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW_1

2019年1月14日 承認
2017年12月7日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

内服薬

レブラミドカプセル

★1日 mg

21日間 服用

Day1(/) Day8(/)
Day15(/) Day22(/)


《ダラザレックス投与1時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T
モンテルカスト錠(10) 1T

過敏反応防止のため

本管

側管



※ダラザレックスの投与速度

0~1時間	↓ () mL/hr
1~2時間	↓ () mL/hr
2~3時間	↓ () mL/hr
3時間以降	↓ () mL/hr


再発難治の場合は下記も追加可

Day2(/) Day9(/)
Day16(/) Day23(/)

点滴治療の場合

本管

側管



内服治療の場合

レナデックス

★1日 mg

服用

DLd療法(2サイクル目)

標準投与量:

Daratumumab	16 mg/kg	day 1,8,15,22
Dexa	20 mg/body	day 1,2,8,9,15,16,22,23
Lenalido	25 mg/body	day1-21
4週毎		