

多発性骨髄腫に対する DLd療法(3-6サイクル目)

(ダラザレックス+レブラミド+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW_1

2017年12月18日 承認
2017年12月7日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

内服薬

レブラミドカプセル

★1日 mg

21日間 服用


Day1(/ /) Day15(/ /)

《ダラザレックス投与1時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T
モンテルカスト錠(10) 1T
過敏反応防止のため

本管

側管



※ダラザレックスの投与速度


0~1時間
↓ () mL/hr
1~2時間
↓ () mL/hr
2-3時間
↓ () mL/hr
3時間以降
↓ () mL/hr

Day2(/ /) Day8(/ /)
Day9(/ /) Day16(/ /)
Day22(/ /) Day23(/ /)

□点滴治療の場合

本管

側管



□内服治療の場合

レナデックス

★1日 mg

服用

DLd療法(3-6サイクル目)

標準投与量:

Daratumumab 16 mg/kg day1,15
Dexa 20 mg/body day 1,2,8,9,15,16,22,23
Lenalido 25 mg/body day1-21
4週毎