

急性リンパ性白血病に対する Inotuzumab Ozogamicin療法

(ベスポンサ)

DRPHW_DRPHW_1

2020年3月16日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8.15日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day 1 (/)

《ベスポンサ投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)

本管

生理食塩水 250ml

側管

(15min)

生理食塩水 50mL
デキサート6.6mg 2V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 20mg)

遮光
(1hr)

生理食塩水 50 mL
ベスポンサ mg
(総量 50mL に調製)

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去可

Day 8 (/) Day 15 (/)

《ベスポンサ投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)

本管

生理食塩水 250ml

側管

(15min)

生理食塩水 50mL
デキサート6.6mg 2V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 20mg)

遮光
(1hr)

生理食塩水 50 mL
ベスポンサ mg
(総量 50mL に調製)

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去可

Inotuzumab Ozogamicin療法

標準投与量:

IO 0.8 mg/m² day1
(CRの場合) 0.5 mg/m² day1
IO 0.5 mg/m² day8.15
3週毎