

# 大腸癌に対する XELIRI+Bevacizumab療法

(イリノテカン+カペシタビン+アバスチン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2018年10月15日 承認

2020年04月16日 改訂(第3版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )		実施サイクル コース目	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1 ( / )

## 《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用

### 本管



終了後、抜去可

初回 : 90分かけてdiv  
↓ (忍耐力良好)  
2回目 : 60分で投与可  
↓ (忍耐力良好)  
以降 : 30分で投与可

Day1 ( / ) 夕 ~ Day15 ( / ) 朝

## 内服薬

カペシタビン錠

★1日量 mg

※1回 錠 ( mg / 回)

を1日2回、14日間服用

### 【カペシタビン初回基準1回量】

体表面積	初回基準量
1.31m <sup>2</sup> 未満	900mg/回
1.31m <sup>2</sup> ~1.64m <sup>2</sup> 未満	1,200mg/回
1.64m <sup>2</sup> 以上	1,500mg/回

※適宜増減

Day2 ( / ) ~ Day3 ( / )

## 《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を  
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用

### XELOX+Bevacizumab療法

#### 標準投与量:

Bev	7.5 mg/kg	day1
CPT-11	200 mg/m <sup>2</sup>	day1
Capecitabine	800 mg/m <sup>2</sup> × 2回	day1-14
3週毎		