

濾胞性リンパ腫に対する BO療法(1コース目)

(ガザイバ+トレアキシ)

DRPHW_DRPHW_1

2018年10月30日 承認

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示(初日)】	
	月	日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]					【調製指示(2回目以降)】	
					<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	

Day1 (/) Day8 (/)
Day15 (/)


《ガザイバ投与30分前に服用》

ポラミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)



ガザイバの本管には生食を使用

Day2 (/) Day3 (/)



※トレアキシは調製後 3時間以内に必ず使用する

B-O療法(1コース目)

標準投与量:	
O	1000 mg/body day1,8,15
Ben	90 mg/m ² day2.3
4週毎	