

# 急性前骨髄球性白血病(AML)に対する【地固め】療法(2)

DRPHW\_DRPHW\_1

2013年12月01日 改訂(第4版)


Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1( / ) ~ Day3( / )



Day4( / ) ~ Day5( / )



## 血小板が10万/μLに回復後

(髄注)蒸留水3mL使用

キロサイド	40mg
メソトレキセート	15mg
プレドニン	10mg

## APL【地固め】療法(2)

標準投与量:

DNR	50 mg/m <sup>2</sup>	day1-3
VP-16	100 mg/m <sup>2</sup>	day1-5
Ara-C	140 mg/m <sup>2</sup>	day1-5