

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する EPOCH療法

(ド+プレドニゾン+オンコビン+エンドキサン+ドキソルビシン) (RPHW_DRPHW)

2010年02月09日 承認
2014年10月23日 改訂(第8版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日~4日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(6日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		


内服薬

プレドニン錠


★1日 () mg

6日間 服用


Day1 (/) ~ Day4 (/)



Day6 (/)



Day5 (/)



EPOCH療法

標準投与量:

VP-16	50 mg/m ²	day1-4
VCR	0.4 mg/m ²	day1-4
ADM	10 mg/m ²	day1-4
CPA	750 mg/m ²	day6
PSL	60 mg/m ²	day1-6

3週毎