

リンパ腫に対する造血幹細胞移植の前処置 MECC療法

(サイメリン+エトポシド+カルボプラチン+エンドキサン) (RPHW_DRPHW)

2018年08月10日 改訂(第4版)


Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>		cm	kg
疾患名	施行予定日	実施サイクル		【調製指示(初日)】		
	月 日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2回目以降)】		
				<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		


Day1 (/ /)




Day6 (/ /)




Day2 (/ /) ~ Day4 (/ /)



Day7 (/ /)



Day5 (/ /)



Day9 (/ /)

PBSCT(末梢造血幹細胞移植)

MECC療法
標準投与量:

MCNU	250 mg/m ²	day1,6
VP-16	20 mg/kg	day2-4
CBDCA	300 mg/m ²	day2-5
CPA	60 mg/kg	day6,7
Mesna	CPA1日量の 40%相当量×3回	day6,7