

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する R-Cladribine療法

(リツキシマブ+ロイスタチン)RPHW_DRPHW\

2010年01月12日 承認
2015年09月15日 改訂(第5版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day 1 (/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)

本管



※リツキシマブ投与速度

最初の1時間
↓ () mg/hr
次の1時間
↓ () mg/hr
以後
↓ () mg/hr


★10倍希釈の場合はmg = mL

Day 2 (/) ~ Day 6 (/)

《点滴開始30分前に服用》

治療開始30分前にグラニセトロンゼリー 1包 内服

本管



R-Cladribine療法

標準投与量:

Rituximab 375 mg/m² 1day
Cladribine 0.1 mg/kg 5days
4-6週毎