

# 悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する R-CHOP療法

(リツキシマブ+エンドキサン+ドキソルビシン+オンコビン+プレドニン) (RPHW\_DRPHW)

2008年05月13日 承認

2015年09月15日 改訂(第9版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 ( / )

### 《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠 (過敏反応)  
カロナール錠 500mg (防止の為)




### ※リツキシマブ投与速度

最初の1時間  
↓ ( ) mg/hr  
次の1時間  
↓ ( ) mg/hr  
以後  
↓ ( ) mg/hr

★10倍希釈の場合はmg = mL

Day2 ( / )

### 本管



### 内服薬

プレドニン錠

★1日 ( ) mg

5日間 服用

### R-CHOP療法

#### 標準投与量:

R	375 mg/m <sup>2</sup>	day1
CPA	750 mg/m <sup>2</sup>	day2
ADM	50 mg/m <sup>2</sup>	day2
VCR	1.4 mg/m <sup>2</sup>	day2
	(max:2mg/body)	
PSL	100 mg/body	day2-6
		3-4週毎