

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する R-THP-COP療法

(リツキシマブ+テラルビシン+エンドキサン+オンコビン+プレドニン) DRPHW DRPHW

2015年09月15日 改訂(第7版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day 1 (/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)



※リツキシマブ投与速度

最初の1時間
↓ () mg/hr
次の1時間
↓ () mg/hr
以後
↓ () mg/hr


★10倍希釈の場合はmg = mL

Day 2 (/)

本管

× ()

側管



内服薬

プレドニン錠

★1日 mg

5日間 服用

R-THP-COP療法

標準投与量:

R	375 mg/m ²	1day
THP	30 mg/m ²	1day
CPA	500 mg/m ²	1day
VCR	1 mg/m ²	1day
	(max:2mg/body)	
PSL	30 mg/m ²	5days

3-4週毎